

## LES FONCTIONS



# LES FONCTIONS

- Définition d'une fonction
- Caractéristiques d'une fonction : domaine, ensemble image , zéros et ordonnée à l'origine
- Fonctions polynomiales : constante, affine, quadratique,...

# Définition d'une fonction

## Exemple 1

Au Québec, l'effet combiné de l'application de la *TPS* (taxes sur les produits et services) et la *TVQ* (taxes de vente du Québec) sur le montant  $x$  hors taxes (HT) d'un produit taxable s'élève approximativement à **15%** de ce prix  $x$ .

Au Québec :



Prix avant taxes

Prix taxes incluses

$$x \mapsto x + 0,15x = (1 + 0,15)x = 1,15x$$

$$T: [0, +\infty[ \rightarrow [0, +\infty[$$

$$x \mapsto T(x) = 1,15x$$

# Définition d'une fonction

## Exemple 1

$$\begin{aligned} T : [0, +\infty[ &\rightarrow [0, +\infty[ \\ x &\mapsto T(x) = 1,15x \end{aligned}$$

Un manteau d'hiver est affiché à **50 \$**, quel montant allez-vous payer à la caisse ?



$$T(50) = 1,15 \times 50 = 57,5 \$$$


# Définition d'une fonction

Une fonction réelle  $f$  est une règle de correspondance qui associe à chaque nombre réel  $x$  au plus un nombre réel  $x$


$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto y = f(x)$$



et  $y$ : variable dépendante



Le graphe de  $f$




# Définition d'une fonction


Une fonction réelle  $f$  est une règle de correspondance qui associe à chaque nombre réel  $x$  au plus un nombre réel  $x$ ,

$$\begin{aligned} x \in \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto y = f(x) \end{aligned}$$

$x$  : variable indépendante et  $y$  : variable dépendante



N'est pas un graphe d'une fonction



Un graphe d'une fonction


# Caractéristiques d'une fonction : domaine d'une fonction


$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto y = f(x)$$

$$\text{Dom}(f) \subseteq \mathbb{R}$$

**Domaine de la fonction**  $f$ , noté  $\text{Dom}(f)$ , est l'ensemble des nombres réels pour lesquels  $f(x)$  est définie (existe).

## Exemple 2

$T(x) = 1,15x$   Domaine mathématique :  $\mathbb{R}$   
Domaine contextuel :  $[0, +\infty[$

$f(x) = \sqrt{x}$    $\text{Dom}(f) = [0, +\infty[$ , car  $\sqrt{x}$  est définie (existe) si et seulement si  $x \geq 0$ .   $f(-4) = \sqrt{-4}$  n'existe pas  
 $f(4) = \sqrt{4} = 2$  (existe)

$g(x) = \sqrt[3]{x}$    $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$ , car  $\sqrt[3]{x}$  est définie pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .   $g(-8) = \sqrt[3]{-8} = -2$  existe  
 $g(8) = \sqrt[3]{8} = 2$  (existe)

$h(x) = \frac{1}{x}$    $\text{Dom}(h) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , car la fraction  $\frac{1}{x}$  est définie (existe) si et seulement si  $x \neq 0$

# Caractéristiques d'une fonction : image d'une fonction

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto y = f(x)$$

**Image d'une fonction réelle**  $f$ , notée  $\text{Im}(f)$  est l'ensemble des nombres réels  $y$  qui peuvent s'écrire comme  $y = f(x)$ , où  $x \in \text{Dom}(f)$

## Exemple 3


$$T(x) = 1,15x$$



$$\text{Im}(T) = [0, +\infty[$$

car  $x > 0$  et  $y = 1,15x > 0$


$$f(x) = \sqrt{x}$$



$$\text{Im}(f) = [0, +\infty[$$

car  $y = \sqrt{x} \geq 0$ , pour tout  $x \in [0, +\infty[$


$$g(x) = \sqrt[3]{x}$$



$$\text{Im}(g) = \mathbb{R}$$

car  $y = \sqrt[3]{x} \in \mathbb{R}$ , pour tout  $x \in \mathbb{R}$

$$h(x) = \frac{1}{x}$$




$$\text{Im}(h) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

# Caractéristiques d'une fonction : image d'une fonction

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto y = f(x)$$


L'ordonnée à l'origine de  $f$  : l'ordonnée  $y = f(0)$ , si  $0 \in \text{Dom}(f)$



**Exemple 4** Trouvez l'ordonnée à l'origine


$$f(x) = 2x + 1$$

$$f(0) = 2 \times 0 + 1 = 1$$




$$g(x) = 2x^2 + 4x + 3$$

$$g(0) = 2 \times 0^2 + 4 \times 0 + 3 = 3$$



$$h(x) = \frac{1}{x}$$

$$h(0) = \frac{1}{0} \text{ n'est pas définie}$$



# Caractéristiques d'une fonction : zéros d'une fonction

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto y = f(x)$$

**Zéros de la fonction**  $f$  : valeurs de  $x \in \text{Dom}(f)$  telles que  $f(x) = 0$

Trouver les Zéros de  $f$

Résoudre l'équation :  $f(x) = 0, x \in \text{Dom}(f)$


Graphiquement : abscisses des points d'intersections  
avec l'axe des  $x$

# Caractéristiques d'une fonction : zéros d'une fonction

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto y = f(x)$$

**Zéros de la fonction**  $f$  : valeurs de  $x \in \text{Dom}(f)$  telles que  $f(x) = 0$

**Exemple 5** Trouvez les zéros de  $T(x) = 1,15x$




$x = 0$  est le zéro de la fonction

# Fonctions polynomiales

## Fonction constante

- $f(x) = k$ , où  $k \in \mathbb{R}$  : fonction **constante**, polynôme de degré **0** à une variable


Graphes : droite horizontale



## Fonction affine

- $f(x) = ax + b$ ,  $a \neq 0$  : fonction **affine**, polynôme de degré **1** à une variable

Graphes : droite oblique



# Fonctions polynomiales

## Fonction affine


- $f(x) = ax + b$ ,  $a \neq 0$  : fonction affine



$a$  : Pente  
: coefficient directeur  
: Taux de variation

$$\begin{aligned} &= \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \\ &= \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \end{aligned}$$

Ordonnée à l'origine  $= f(0) = b$



## Exemple 6

$T(x) = 1,15x$  : fonction affine



$a = 1,15$



le prix après taxes augmente de 1,15 \$ quand le prix avant taxes augmente d'un dollar.

$T(x) = 1,15x$  : fonction affine




L'ordonnée à l'origine  $b = 0$

Si on n'achète rien, on paye 0 \$

# Fonctions polynomiales

## Comment trouver l'équation d'une droite passant par deux points

**Exemple 6** Donnez l'équation de la droite passant par les points  $A(-1,1)$  et  $B(3,9)$



# Fonctions polynomiales


## Fonction quadratique

- $f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$  : polynôme de degré 2 à une variable

Graphes : paraboles



Le sommet de la parabole :  $x_s = -\frac{b}{2a}$  et  $y_s = f(x_s)$




Les zéros de la parabole :  $\Delta = b^2 - 4ac$

Résoudre  $f(x) = 0$


$\Delta < 0 \Rightarrow$  La parabole n'admet aucun zéro

$\Delta = 0 \Rightarrow$  La parabole admet un seul zéro :  $x_0 = -\frac{b}{2a}$




$\Delta > 0 \Rightarrow$  La parabole admet deux zéros :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$



Parabole ouverte vers le haut ou vers le bas?

- Si  $a > 0 \Rightarrow$



et si  $a < 0 \Rightarrow$



# Fonctions polynomiales


## Fonction quadratique

**Exemple 7**  $f(x) = -x^2 - 2x + 3$

$a = -1$   
 $b = -2$   
 $c = 3$

- Le sommet de la parabole :  $x_s = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{-2} = -1$  et  $y_s = f(x_s) = 4$


- $a = -1 < 0$



- $\Delta = 16 > 0$ , l'équation  $-x^2 - 2x + 3 = 0$  admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = 1 \text{ et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = -3$$

La parabole coupe l'axe des  $x$  aux points :  $(-3, 0)$  et  $(1, 0)$



# Fonctions polynomiales

- $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ,  $a_n \neq 0$  : polynôme de degré  $n$  à une variable

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

$$\text{Zéros de } f : \text{résoudre } a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$

$$\text{L'ordonnée à l'origine : } y = f(0)$$

$$f(x) = -2 \quad \longrightarrow \quad \text{degré 0}$$

$$f(x) = 3x - 1, \quad \longrightarrow \quad \text{degré 1}$$

$$f(x) = -x^2 + 2x - 3 \quad \longrightarrow \quad \text{degré 2}$$

$$f(x) = 2x^{10} - x^5 - x + 1 \quad \longrightarrow \quad \text{degré 10} \quad \dots$$

# Résumé

**Fonction polynomiale** :  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$ ,  $a_n \neq 0$

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

Zéros : Résoudre  $f(x) = 0$

- $f(x) = k$ ,  $k \in \mathbb{R}$  : Fonction **constante**  **Droite horizontale**
- $f(x) = ax + b$ ,  $a \neq 0$  : Fonction **affine**  **Droite oblique**
- $f(x) = ax^2 + bx + c$ ,  $a \neq 0$  : Fonction **quadratique**  **Parabole**

## Références

- Michèle Gingras, Mathématique d'appoint, 5<sup>e</sup> édition, 2015, Éditeur Chenelière éducation
- Josée Hamel, Mise à niveau Mathématique, 2<sup>e</sup> édition, 2017, Éditeur Pearson (ERPI)